



Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias
Campo Experimental Zacatecas

ESTADO DE ZACATECAS

Potencial

- Alto (14,280 ha)
- Medio (61,506 ha)

Simbología

- Poblaciones

CULTIVO: Haba (*Vicia faba* L.)**CICLO:** Primavera/Verano.**RÉGIMEN DE HUMEDAD:** Temporal.**POTENCIAL DE PRODUCCIÓN:** Alto y mediano.**TIPO DE SIEMBRA Y LABRANZA:** Mecánica o manual.

VARIEDAD	DENSIDAD DE SIEMBRA (plantas/ha)	ÉPOCA DE SIEMBRA
Criolla Terragona	50,000 (65 a 70 kg/ha de semilla)	Desde el inicio del temporal hasta el 15 de julio

FERTILIZACIÓN: Aplicar al momento de la siembra la dosis 60-40-00.**CONTROL DE PLAGAS:** Contra el pulgón aplicar carbarilo 80% PH, 1.5 kg/ha. Para controlar el frailecillo aplicar paration metílico, 1.0 L/ha.**CONTROL DE MALEZAS:** Realizar por lo menos dos escardas complementando con deshierbes manuales.**CONTROL DE ENFERMEDADES:** Pudrición radical: Desinfección de la semilla con captan, 200 g/100 kg de semilla y rotación de cultivos. Roya: maneb 80% PH, 1.5 kg/ha. Mancha de chocolate: zineb, 2.0 kg/ha.**OTRAS ACTIVIDADES:****RENDIMIENTO POTENCIAL:** 2 a 3 t/ha.