



**CULTIVO: Vid (*Vitis vinifera* L.)****REGIÓN II****(Vinos de mesa de calidad, vinos licorosos, uva de mesa intermedia y tardía, jugos)****CICLO:** Perenne.**RÉGIMEN DE HUMEDAD:** Riego. Recomendable: Riego por goteo.**POTENCIAL DE PRODUCCIÓN:** Alto y mediano.**TIPO DE PLANTACIÓN Y LABRANZA:** Sobre portainjertos resistentes a la Filoxera, Mecánica o manual.

<b>VARIEDAD</b>	<b>DENSIDAD DE PLANTACIÓN</b>	<b>ÉPOCA DE PLANTACIÓN</b>
Para Vino: Rojas: Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Malbec, Petite Syrah, Pinot Noir, Valdepeñas, Zinfandel, Aleático, Gamay, Carignán, Grenache, Souzao, Barbera, Sangiovese, Nebiolo Fino.  Blancas: Chenin Blanc, Clairette Blanche, Chasselas Doré, Melón, Red Veltliner, Semillón, Sauvignon Blanc, White Riesling, Sylvaner, Chardonnay, Gewürztraminer.	2222 (3 x 1.50 m) o 2666 (3 x 1.25 m) o 3333 (2 x 1.50 m), o 4000 (2 x 1.25 m)	Finales del Invierno (Febrero - Marzo)
Para Mesa: Red Globe, Italia, Dattier de Beyrouth, Kishmishi, Muscat Flame, Málaga Roja, Moscatel de Hamburgo, Queen.	1851 plantas / ha (3 x 1.80 m)	Finales del Invierno (Febrero - Marzo)

**FERTILIZACIÓN:** Para viñedos nuevos (primer año), aplicar la dosis 00-100-300 justo antes de la plantación (fertilización de fondo), dentro de la zanja donde irán las plantas. Los siguientes dos años, fertilizar con la dosis 80-30-80. En viñedos en producción, de cuatro años en adelante, aplicar la dosis 120-35-120; la mitad del nitrógeno y la totalidad del fósforo y el potasio un poco antes de la brotación y la otra mitad del nitrógeno pasando la floración. El fósforo puede ser aplicado alternando los años (uno sí, otro no). En caso de riego por goteo, la dosis 120-35-120 debe ser aplicada semanal o quincenalmente, teniendo cuidado de aplicar la totalidad del nitrógeno de la brotación al cuajado del fruto y los otros dos elementos de la brotación hasta la caída de las hojas.

**PROGRAMA DE RIEGOS:** Para viñedos nuevos (primer año), aplicar el riego de plantación y los de auxilio cada semana, durante un mes; posteriormente, se debe regar cada 20 a 25 días hasta la caída de las hojas. Para viñedos en producción, los riegos se distribuirán cada 20 a 25 días, desde la brotación hasta la cosecha. En ambas etapas de los viñedos -en poscosecha o después de la caída de las hojas-, se debe mantener una ligera humedad en el suelo hasta la brotación. En riego por goteo, el número de horas de riego semanales debe compensar el 70 % del agua evapotranspirada en la semana previa.

**CONTROL DE PLAGAS:** Para la Filoxera, utilizar portainjertos resistentes y que se adapten al tipo de suelo: Rupestris du Lot, R 110, 3309 C, 1103 P, 101-14 MG, SO4, 140 Ru. Para los Trips, aplicar por hectárea: 2.0 L de oxidemeton metilo R-25 E, 1.0 L de ometoato 84 LM o 2.5 L de endosulfan 35 E, al inicio de la floración. Para la araña amarilla, aplicar por hectárea 2.0 L de oxidemeton metilo R-25 E, 2.5 L de dicofol 35 E, o 2.0 Kg de propargite 35. Para pulgón negro hacer aplicaciones dirigidas a las puntas de las ramas con 2.0 L de oxidemeton metilo R-25 E, 1.0 L de ometoato 84 LM o 1.0 Kg de pirimicarb 50 W.

**CONTROL DE MALEZAS:** Tradicional: entre líneas dar un paso de rastra y entre plantas, deshierbar con azadón periódicamente. Mecánico: entre líneas utilizar la rastra y entre plantas utilizar el "Arado Francés". Químico de contacto: (hoja ancha y angosta); gramoxone 2.05 L, cuando la hierba esté pequeña. Sistémico (para zacates); fluazifop-P BIW 2.0 L y sistémico (hoja ancha y angosta); glifosato 3.0 L. Todas estas aplicaciones son entre plantas y la dosis es por hectárea, calibrando específicamente la aspersora para cada caso.

**CONTROL DE ENFERMEDADES:** Para el Oidium (cenicilla polvorienta) aplicar 4.0 kg de azufre humectable o 0.5 kg de triadimefon. Para Mildew (cenicilla vellosa), aplicar 2.5 kg de maneb 200, oxiclورو de cobre (3.0 kg) o fosetil-al (2.0 kg) y para Botrytis (pudrición del racimo), aplicar iprodione 5 PH (1.5 kg) o tiabendazole (1.0 kg). Las dosis son por hectárea y los productos son disueltos en 1000 L de agua. Hacer cuatro aplicaciones de estos productos: la primera se realiza antes de la floración y las demás cada 20 a 25 días. Las aplicaciones son de carácter preventivo.

**OTRAS ACTIVIDADES:** La poda de formación se realiza del año 2 al año 4, en los meses de febrero y marzo; a partir del quinto año la poda de invierno se efectúa entre los meses de enero a marzo (antes de la brotación) y la poda en verde se practica durante la etapa de crecimiento (abril – julio), eliminando brotes mal ubicados. En uvas de mesa, el aclareo y despunte de racimos se realiza cuando los granos tienen el tamaño de una munición.

**RENDIMIENTO POTENCIAL:** De 10 a 30 t/ha; 10 t/ha para las variedades poco vigorosas (como Merlot, Cabernet, Franc y otras) y 30 t/ha para las variedades más vigorosas y fértiles (como Aleático, Red globe, Dattier de Beyrouth, entre otras).