



ESTADO DE ZACATECAS

Potencial

- Alto (243,672 ha)
- Medio (517,639 ha)

Simbología

- Poblaciones

Compass rose showing North (N), South (S), East (E), and West (W).

CULTIVO: Trigo forrajero (*Triticum aestivum*)

CICLO: Anual.

RÉGIMEN DE HUMEDAD: Riego.

ZONA ECOLÓGICA: Árido templado (Altiplano).

VARIEDAD: Delicias F-81, Anahuac F-75, Salamanca S-75, Guerrero VF-88.

FECHA DE ESTABLECIMIENTO: Del 1 de diciembre al 15 de enero.

DENSIDAD DE SIEMBRA: 100-120 kg/ha.

CONTROL DE PLAGAS, MALEZAS Y ENFERMEDADES: Puede atacar el pulgón del follaje y se controla con Pirimor 50 W a 0.5 kg/ha, o Dimetoato 40 E o Malatión 1000 E a 1.0 L/ha, o Lannate 90 PS a razón de 0.4 kg/ha, o Folimat 84 LM a 0.4 L/ha

FERTILIZACIÓN AL ESTABLECIMIENTO: Se recomienda incorporar con sembradora fertilizadora o con rastra antes de la siembra la fórmula 100-60-00. Si se da un segundo corte, aplicar la fórmula 50-00-00.

PROGRAMA DE RIEGOS: El de siembra y riegos de auxilio cada 15 o 20 días hasta su cosecha.

INICIO DEL CORTE O PASTOREO: Aproximadamente a los 80-85 días después de la siembra dependiendo de la variedad, se recomienda el inicio del pastoreo. Si se quiere cortar para empacar se puede cortar en floración o grano formado.

RENDIMIENTO ANUAL DE MATERIA SECA (MS): Dependiendo del manejo y de la variedad se pueden obtener desde 4.5 hasta 6.0 t/ha.