

Reporte agrometeorológico

Diciembre de 2008



Red de monitoreo agroclimático
del estado de Zacatecas

Guillermo MEDINA GARCÍA

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARIAS
CENTRO DE INVESTIGACIÓN REGIONAL NORTE CENTRO
CAMPO EXPERIMENTAL ZACATECAS

No está permitida la reproducción total o parcial de esta publicación, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de la Institución.

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias.
Progreso No. 5, Barrio de Santa Catarina
Delegación Coyoacán
04010 México, D.F.
Tel. (55) 3871-8700

Primera edición. 2008
Impreso en México



Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales, Agrícolas y Pecuarias

Reporte agrometeorológico Diciembre de 2008

Guillermo MEDINA GARCÍA¹

¹Dr. Investigador responsable de la Red de Monitoreo agroclimático del estado de Zacatecas.
Campo Experimental Zacatecas. INIFAP.

Contenido

ANTECEDENTES	1
RED DE MONITOREO AGROCLIMÁTICO.....	2
RESUMEN MENSUAL DE VARIABLES METEOROLÓGICAS	4
AGRICULTURA Y CLIMA	5
Temperatura.....	5
Requerimientos de bajas temperaturas por las plantas	5
Horas frío.....	6
Acumulación de horas frío.....	7
Heladas	12
Ocurrencia de heladas	13
RESUMEN MENSUAL	15
LITERATURA CITADA.....	17

Antecedentes

La agricultura es una actividad estrechamente relacionada con el clima. La cantidad de lluvia, la humedad almacenada en el suelo, la ocurrencia de una helada o de granizo, constituyen algunos de los componentes del clima que año con año repercuten en la producción de cosechas. La presencia de plagas y enfermedades, la eficiencia en la absorción de nutrientes, la demanda de agua por las plantas y la duración de los ciclos vegetativos, dependen también en gran medida de las condiciones del clima (FAO, 1981; Critchfield, 1983; Silva y Hess, 2001).

En el estado de Zacatecas la mayor parte de la agricultura se realiza en condiciones de temporal (INEGI, 2006), la cual se caracteriza por alta frecuencia de sequías, ocurrencia de heladas tempranas, lluvias torrenciales y mal distribuidas, y en general pueden presentarse heladas tardías y vientos de gran intensidad.

Con el propósito de tener un conocimiento de las condiciones del clima en relación con el desarrollo de los cultivos y su manejo, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), implementó en el año 2002 el proyecto “Red de monitoreo agroclimático del estado de Zacatecas”, financiado por la Fundación Produce Zacatecas, A. C.

La “Red de monitoreo agroclimático” es una herramienta de apoyo a la toma de decisiones de las dependencias estatales y federales involucradas en el desarrollo agropecuario del Estado, así como para los agricultores y ganaderos.

Como parte de la estrategia para la divulgación de la información registrada por la red de estaciones, se presenta la publicación de un reporte agrometeorológico mensual, con el objetivo de dar a conocer información de las condiciones ambientales prevalecientes durante cada mes, relacionada con el desarrollo de los cultivos y comparada con las condiciones climáticas normales.

Red de monitoreo agroclimático del estado de Zacatecas

La red cuenta con 36 estaciones climáticas automáticas (Cuadro 1) distribuidas (Figura 1) en el Estado, cubriendo diferentes ambientes. Cada estación está equipada para medir la temperatura del aire, humedad relativa, precipitación, dirección y velocidad del viento, radiación solar y humedad de la hoja. La medición de las condiciones del estado del tiempo se realiza cada 15 minutos y los datos son transmitidos por las estaciones a la base central que se encuentra ubicada en el Campo Experimental Zacatecas (Medina *et al.*, 2007). La información de las estaciones puede ser consultada en tiempo real en Internet en el sitio:

www.zacatecas.inifap.gob.mx

en donde se pueden consultar los datos en forma diaria y en forma gráfica. Se presentan también índices agroclimáticos como horas frío, horas de heladas y evapotranspiración. La información está disponible para los productores, dependencias relacionadas con el Sector Agropecuario y para el público en general.

CUADRO 1. ESTACIONES DE LA RED DE MONITOREO AGROCLIMÁTICO DEL ESTADO DE ZACATECAS.

ESTACIÓN	MUNICIPIO
Campo Exp. Zacatecas	Calera
Cañitas	Cañitas Felipe P.
Mesa de Fuentes	Enrique E.
Mogotes	F. R. Murguía
Ábrego	Fresnillo
Col. Emancipación	Fresnillo
El Pardillo 3	Fresnillo
Rancho Grande	Fresnillo
U.A. Biología	Guadalupe
Santo Domingo	Jalpa
Santa Rita	Jerez
Santa Fe	Jerez
Loreto	Loreto
El Gran Chaparral	Luis Moya
Marianita	Mazapil
Tanque de Hacheros	Mazapil
Campo Uno	Miguel Auza
Momax	Momax
El Saladillo	Pánfilo Natera
La Victoria	Pinos
Col. Progreso	Río Grande
Col. González Ortega	Sombrerete
Col. Hidalgo	Sombrerete
Emiliano Zapata	Sombrerete
Providencia	Sombrerete
Tierra Blanca	Tabasco
Tepechitlán	Tepechitlán
Las Arcinas	Trancoso
CBTA Valparaíso	Valparaíso
Agua Nueva	Villa de Cos
Chaparrosa	Villa de Cos
COBAEZ Villa de Cos	Villa de Cos
Sierra Vieja	Villa de Cos
Estancia de Ánimas	Villa G.Ortega
Villanueva	Villanueva
U.A. Agronomía	Zacatecas




FIGURA 1. RED DE MONITOREO AGROCLIMÁTICO DEL ESTADO DE ZACATECAS.

Resumen mensual de variables meteorológicas

Mes de Diciembre

TEMPERATURA

	°C	Estación
Promedio	11.6	
Máxima promedio	22.3	
Máxima extrema	31.1	Santo Domingo
Mínima promedio	1.5	
Mínima extrema	-11.1	CEZAC
Promedio histórico**	12.5	

PRECIPITACIÓN

	mm	Estación
Promedio mensual	0.0	
Mínima	0.0	
Máxima	0.2	
Promedio decena uno	0.0	
Mínima	0.0	
Máxima	0.0	
Promedio decena dos	0.0	
Mínima	0.0	
Máxima	0.0	
Promedio decena tres	0.0	
Mínima	0.0	
Máxima	0.2	Tanque de Hacheros
Promedio histórico mensual**	15.2	

HUMEDAD RELATIVA

	%	Estación
Promedio	46.3	
Máxima promedio	78.6	
Máxima extrema	100.0	Varias
Mínima promedio	19.0	
Mínima extrema	7.0	CBTA Valparaíso

VIENTO

	km	Estación
Promedio	5.3	
Máxima promedio	15.2	
Máxima extrema	49.0	Rancho Grande
Dirección dominante	SO	

*Los promedios son obtenidos de las 36 estaciones de la red.

**Fuente: CNA. Datos históricos 1961-2003.

Agricultura y clima

Temperatura

La temperatura se considera como la esencia del clima. La mayoría de los procesos fisiológicos que se realizan durante el crecimiento y desarrollo de las plantas están fuertemente influenciados por la temperatura. En algunas especies, las bajas temperaturas estimulan la floración, mientras que en otras requieren temperaturas relativamente altas antes de la floración (Ortiz, 1987).

En general las especies vegetales sobreviven a temperaturas que varían de los 0 a los 50°C. La producción de cultivos usualmente ocurre donde la temperatura media del período de crecimiento varía entre 10 y 41°C (Ortiz, 1987; Torres, 1983).

Requerimientos de bajas temperaturas por las plantas.

Los efectos de las bajas temperaturas no siempre son negativos. Ciertas especies como los cereales de invierno y los frutales de hoja caduca (árboles caducifolios), requieren de la acumulación de cierta cantidad de temperaturas bajas durante el descanso invernal (letargo), para poder continuar su desarrollo en la próxima primavera sin ninguna anomalía fenológica o sin mermas en su rendimiento (Romo y Arteaga, 1989).

Valores de temperatura entre 0°C y 10°C, son los que se consideran necesarios para la acumulación de frío durante el letargo. Su variación depende de la especie, la variedad y de cómo la temperatura se presente en el año. En general se han aceptado umbrales de 4 a 5°C para cereales de invierno y de 6 a 7°C para frutales; temperaturas inferiores a dichos valores serían las efectivas para el letargo (Romo y Arteaga, 1989; Villalpando, 1985).

Horas frío

Los requerimientos de bajas temperaturas que presentan las plantas frecuentemente se miden en “horas frío” (HF), sobre todo en frutales caducifolios. Este parámetro es usado ampliamente para evaluar la posibilidad de establecimiento de un cultivo en distintas regiones climáticas.

Una hora frío es aquella en la cual la temperatura del aire es igual o inferior a 7° C (Romo y Arteaga, 1989; Ortiz, 1987). La determinación de la cantidad de horas frío que se acumulan en una localidad durante el invierno, consiste en sumar las horas en que la temperatura es de 7° C o menor.

Si los requerimientos de frío de alguna variedad frutal no son satisfechos, se presentarán desórdenes fisiológicos, como poca floración, que disminuirán su productividad en la siguiente época de crecimiento.

Algunos de los principales síntomas de la deficiencia de horas frío son:

- Prolongación del período de reposo.
- Irregularidad en el rompimiento del reposo.
- Floración raquítica e irregular.
- Foliación exclusiva de yemas terminales.
- Falta de ramificación y presencia de espacios vacíos.
- Cosecha reducida, extemporánea y de mala calidad.

En el Cuadro 2, se presentan los requerimientos de horas frío de algunas especies y variedades de frutales que pudieran prosperar en la región del altiplano de Zacatecas. Las horas frío normalmente se cuantifican en los meses de noviembre a febrero (Medina et al., 2003), ya que representan el mayor porcentaje del total acumulado.

CUADRO 2. REQUERIMIENTOS DE HORAS FRÍO DE ALGUNAS VARIETADES DE FRUTALES.

Espezie	Varieta	Horas frío	Clasificación de requerimiento
Durazno	Victoria	600-750	Medio
	Criollo	400-750	Medio
Manzano	Agua Nueva II	600-700	Medio
	Red Delicious	700-800	Medio
	Anna	300-350	Bajo
Chabacano	Canino	600-750	Bajo
	Criollo	400-500	Bajo
Ciruelo	Frontera	700	Medio
	Santa Rosa	700	Medio
	Laroda	700	Medio
Pera	Kieffer	500-600	Bajo
	Criollo	600	Bajo

Fuente: Programa de frutales caducifolios. CEZAC.

Acumulación de horas frío

En la primera decena del mes de diciembre se registraron en promedio 83 HF, variando desde 12 HF en la estación Santo Domingo, Jalpa, hasta 109 en la estación Col. Hidalgo, Sombrerete. Veintisiete de las 36 estaciones registraron más de 80 HF (Figura 2).

En la segunda decena del mes de diciembre fue similar a la primera en cuanto al número de días con temperaturas bajas, registrándose en promedio 78 HF y variando desde 14 HF en la estación de Santo Domingo, Jalpa hasta 115 en la estación Momax, Momax. En esta decena 19 de las 36 estaciones registraron más de 80 HF (Figura 3).

En la tercera decena del mes de diciembre el frío disminuyó con respecto a la decena anterior, registrándose en promedio 69 HF y variando desde 1 HF en la estación Santo Domingo, Jalpa, hasta 111 HF en la estación Momax, Momax. En esta decena sólo 12 estaciones registraron un mayor número de horas frío (Figura 4).

Considerando las horas frío acumuladas durante todo el mes de diciembre, en promedio se registraron 232 HF, variando desde 26 HF en la estación Santo Domingo, Jalpa hasta 334 en la estación Momax, Momax (Figura 5). De manera general en la mayor parte del Estado hubo buena acumulación de horas frío.

Durante los meses de noviembre a diciembre se han acumulado en promedio 428 HF, registrándose un mínimo de 35 HF en la estación de Santo Domingo, Jalpa, hasta 592 en la estación Ábrego, Fresnillo (Figura 6). De acuerdo al Cuadro 2, aun no es suficiente la acumulación de horas frío, pero se continuará acumulado, ya que estamos en plena temporada de invierno.

En la Figura 7 se presentan gráficas de las horas frío decenales acumuladas durante el período invernal, de dos estaciones diferentes. Las gráficas de las 36 estaciones se pueden consultar en el sitio de Internet del Campo Experimental Zacatecas.




FIGURA 2. Horas frío acumuladas en la primera decena del mes de diciembre del 2008.




FIGURA 3. Horas frío acumuladas en la segunda decena del mes de diciembre del 2008.




FIGURA 4. Horas frío acumuladas en la tercera decena del mes de diciembre del 2008.




FIGURA 5. Horas frío acumuladas en el mes de diciembre del 2008.





FIGURA 6. Horas frío acumuladas durante los meses de noviembre a diciembre del 2008.



**HORAS FRIO DECENALES DE LA ESTACION
EMILIANO ZAPATA, SOMBRERETE**

FUNDACIÓN *Zacatecas* A.C.
PRODUCE



**HORAS FRIO DECENALES DE LA ESTACION
CHAPARROSA, VILLA DE COS**

FUNDACIÓN *Zacatecas* A.C.
PRODUCE




FIGURA 7. Horas frío acumuladas durante la presente temporada de invierno en dos estaciones de la red.

Heladas

No existe una definición universalmente aceptada de este fenómeno. Desde el punto de vista meteorológico, se dice que se produce una helada cuando la temperatura desciende a los 0°C o menos. La observación se hace generalmente en el termómetro que está a una altura de 1.5 m (Romo y Arteaga, 1989). De acuerdo al criterio agrometeorológico, la helada ocurre cuando la temperatura del aire desciende a temperaturas tan bajas, que provocan la muerte de los tejidos vegetales.

Las heladas se pueden clasificar de acuerdo a su época de ocurrencia en:

- Otoñales (tempranas)
- Invernales
- Primaverales (tardías)

Las heladas invernales son las que menor daño provocan, dado que en esa época la mayoría de las plantas se encuentran en reposo y por lo tanto en condiciones de soportar bajas temperaturas.

Las heladas tempranas y tardías son las que más estragos causan en la agricultura, ya que se presentan en épocas de intensa actividad vegetativa. Las tempranas pueden interrumpir el proceso de maduración de los frutos y la formación de yemas, de las cuales dependerá la producción del año siguiente. Las tardías causan daños sobre la floración, foliación y fructificación de las plantas perennes y sobre la germinación, emergencia y estadios juveniles de las anuales (Romo y Arteaga, 1989).

En el estado de Zacatecas es significativo el número de heladas que ocurren durante el período de otoño-invierno, aunque muchas veces no existe la sensación de helada debido a su corta duración.

Ocurrencia de heladas

Con la “Red de monitoreo agroclimático” es posible registrar el número de heladas, su temperatura y algo muy importante, su duración. En el Cuadro 3 se presentan las estadísticas del mes de diciembre en relación con el frío, observándose que la temperatura mínima promedio más baja en el mes, ocurrió en la estación El Pardillo 3, Fresnillo, con -2.5°C y el valor mínimo de la temperatura registrado durante el mes fue de -11.1°C en la misma estación. En la Figura 8 se presentan los valores mínimos de temperatura registrados durante el mes.

Considerando una temperatura de helada de 0°C , en el mismo Cuadro 3 se puede apreciar que la estación con mayor número de horas con helada, fue el Pardillo 3, Fresnillo, con 122; esta misma estación también registró el mayor número de días con helada, siendo de 23 días.




FIGURA 8. Valores mínimos de temperatura registrados en el mes de diciembre del 2008.

CUADRO 3. ESTADÍSTICAS CLIMATOLÓGICAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2008 RELACIONADAS CON EL FRÍO DE LAS ESTACIONES DE LA RED DE MONITOREO AGROCLIMÁTICO DEL ESTADO DE ZACATECAS.

ESTACIÓN	TEMPERATURA °C		FRÍO	HELADAS	
	MÍNIMA MEDIA	VALOR MÍNIMO	HORAS	HORAS	NUMERO
Ábrego	-1.6	-9.5	316.5	92.5	22
Agua Nueva	3.8	-9.1	134.3	14.0	6
C. Exp. Zacatecas	1.1	-8.7	253.0	38.8	8
Campo Uno	1.7	-5.0	223.8	28.3	8
Cañitas	1.0	-7.0	242.0	41.3	10
CBTA Tepechtlán	3.0	-1.9	198.3	7.8	4
CBTA Valparaíso	1.3	-3.0	248.3	26.0	10
Chaparrosa	-0.8	-8.9	260.5	67.8	17
COBAEZ Villa de Cos	1.2	-6.7	239.3	37.8	9
Col. Emancipación	0.0	-8.4	265.8	60.8	15
Col. González Ortega	4.3	-2.9	156.8	9.8	2
Col. Hidalgo	0.4	-7.6	297.3	51.5	12
Col. Progreso	1.3	-7.3	230.8	43.3	9
El Gran Chaparral	0.2	-5.8	244.8	40.3	12
El Pardillo 3	-2.5	-11.1	304.0	122.0	23
El Saladillo	0.2	-8.1	258.0	39.0	12
Emiliano Zapata	5.3	-1.7	109.5	11.8	2
Estancia de Ánimas	1.2	-7.4	256.3	32.0	7
La Victoria	3.5	-1.9	195.8	6.3	2
Las Arcinas	0.8	-7.6	226.5	37.0	12
Loreto	-0.9	-7.6	285.8	80.8	21
Marianita	1.9	-7.5	206.5	36.8	8
Mesa de Fuentes	2.5	-3.8	218.5	26.3	7
Mogotes	2.4	-5.1	233.8	31.5	6
Momax	-1.3	-6.1	333.5	87.5	22
Providencia	3.9	-5.0	164.8	20.0	5
Rancho Grande	2.0	-6.7	218.8	33.0	7
Santa Fe	0.2	-3.6	290.0	45.0	15
Santa Rita	0.5	-4.2	286.5	36.5	12
Santo Domingo	7.5	2.9	26.3	0.0	0
Sierra Vieja	-0.3	-7.1	264.0	59.3	15
Tanque de Hacheros	0.4	-9.5	260.5	48.8	11
Tierra Blanca	1.8	-3.1	224.5	14.3	6
U.A. Agronomía	1.3	-8.7	256.5	37.3	7
U.A. Biología	6.8	-0.6	68.0	1.8	1
Villanueva	-0.7	-7.2	265.5	42.8	17
PROMEDIO	1.5	-5.9	229.6	39.1	10.1
VALOR MÁXIMO	7.5	2.9	333.5	122.0	23.0
VALOR MÍNIMO	-2.5	-11.1	26.3	0.0	0.0

Resumen mensual

CUADRO 6. ESTADÍSTICAS BÁSICAS MENSUALES DE TEMPERATURA DEL AÑO 2008 DE LA RED DE MONITOREO AGROCLIMÁTICO DEL ESTADO DE ZACATECAS.

MES	TEMPERATURA (°C)						
	VALOR MÁXIMO	ESTACIÓN	VALOR MÍNIMO	ESTACIÓN	MEDIA* MÁXIMA	MEDIA* MÍNIMA	MEDIA*
Enero	29.9	Momax	-10.4	El Pardillo 3	21.7	1.3	11.4
Febrero	33.8	Tierra Blanca	-7.3	Abrego	24.2	2.6	13.7
Marzo	34.6	Tierra Blanca	-9.6	Abrego	24.9	3.7	14.9
Abril	36.8	Santo Domingo	-1.4	Momax	29.0	8.0	19.3
Mayo	38.1	Santo Domingo	1.5	Momax	29.2	11.1	20.6
Junio	37.8	Momax	7.6	Las Arcinas	28.8	13.6	21.1
Julio	33.5	Marianita	6.5	Abrego	25.4	13.1	18.5
Agosto	32.7	Marianita	7.2	Las Arcinas	25.1	13.5	18.4
Septiembre	31.8	Momax	4.8	Abrego	23.0	12.4	17.0
Octubre	31.5	Tierra Blanca	-0.8	El Pardillo 3	23.7	7.9	15.4
Noviembre	29.5	Santo Domingo	-8.5	CEZAC	22.7	2.4	12.3
Diciembre	31.1	Tierra Blanca	-11.1	El Pardillo 3	22.3	1.5	11.6

*Promedios considerando todas las estaciones de la red.

CUADRO 7. ESTADÍSTICAS BÁSICAS MENSUALES DE HUMEDAD RELATIVA Y VIENTO DEL AÑO 2008 DE LA RED DE MONITOREO AGROCLIMÁTICO DEL ESTADO DE ZACATECAS.

MES	HUMEDAD RELATIVA (%)			VELOCIDAD DEL VIENTO (km/hr)				VIENTO DIRECCIÓN DOMINANTE*
	MEDIA* MÁXIMA	MEDIA* MÍNIMA	MEDIA*	VALOR MÁXIMO	ESTACIÓN	MEDIA* MÁXIMA	MEDIA*	
Enero	68.9	15.0	38.3	62.0	Mogotes	20.4	7.8	SO
Febrero	58.6	10.6	29.6	66.0	Col. Progreso	21.1	8.0	SO
Marzo	51.6	9.8	25.4	80.0	El Pardillo 3	23.6	9.9	OSO
Abril	58.6	10.6	28.9	46.5	Estancia d Ánimas	21.1	8.0	OSO
Mayo	68.3	14.3	36.6	54.9	Mogotes	21.9	8.3	OSO
Junio	84.3	24.2	53.2	56.0	El Pardillo 3	21.4	7.9	ESE
Julio	94.0	39.9	70.2	47.0	Col. Progreso	19.4	7.0	ESE
Agosto	96.6	46.2	76.6	62.0	Abrego	16.2	4.6	ESE
Septiembre	97.6	54.9	81.2	42.0	Rancho Grande	14.0	4.6	E
Octubre	93.9	33.8	66.3	44.0	La Victoria	13.5	4.6	ENE
Noviembre	89.8	21.3	54.6	41.0	Rancho Grande	14.6	5.0	SO
Diciembre	78.6	19.0	46.3	49.0	Rancho Grande	15.2	5.3	SO

*Promedios considerando todas las estaciones de la red.

CUADRO 8. ESTADÍSTICAS BÁSICAS MENSUALES DE PRECIPITACIÓN DEL AÑO 2008 DE LA RED DE MONITOREO AGROCLIMÁTICO DEL ESTADO DE ZACATECAS.

ESTACIÓN	PRECIPITACIÓN (mm)												
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
Ábrego	0.0	4.6	0.0	1.4	14.6	66.8	115.6	224.6	203.4	10.6	0.0	0.0	641.6
Agua Nueva	0.0	8.4	0.0	2.4	22.0	26.2	65.2	132.8	171.6	5.4	0.0	0.0	434.0
C. Exp. Zacatecas	0.0	13.6	0.0	5.2	12.2	10.4	91.4	144.4	113.6	5.4	0.0	0.0	396.2
Campo Uno	0.0	2.6	0.0	7.6	2.4	68.6	65.0	222.2	132.4	28.4	0.0	0.0	529.2
Cañitas	0.0	5.6	0.0	0.4	14.8	32.4	84.4	152.0	176.2	21.0	0.0	0.0	486.8
CBTA Tepechitlán	0.0	0.0	0.0	7.6	1.0	207.2	309.4	155.8	70.8	7.6	0.0	0.0	759.4
CBTA Valparaíso	0.0	2.4	0.0	0.8	8.4	63.2	128.0	202.0	97.6	12.6	0.0	0.0	515.0
Chaparrosa	0.0	6.0	0.0	0.2	13.8	7.6	111.6	174.2	72.2	14.4	0.0	0.0	400.0
COBAEZ	0.0	11.4	0.0	0.0	11.0	4.4	135.4	181.0	128.4	3.8	0.0	0.0	475.4
Col. Emancipación	0.0	8.0	0.0	4.6	6.8	41.4	114.2	177.0	177.2	15.8	0.0	0.0	545.0
Col. Glz. Ortega	0.0	4.0	0.0	1.2	3.0	132.4	107.8	255.0	110.0	11.2	0.0	0.0	624.6
Col. Hidalgo	0.0	1.8	0.0	6.4	3.0	57.2	134.6	344.0	102.0	14.4	0.0	0.0	663.4
Col. Progreso	0.0	1.6	0.0	5.4	1.4	104.4	110.4	252.8	205.0	12.8	0.0	0.0	693.8
El Gran Chaparral	0.0	3.0	0.0	5.0	7.4	35.8	92.0	186.6	65.8	1.0	0.0	0.0	396.6
El Pardillo 3	0.0	14.0	0.0	4.6	14.2	23.6	138.8	173.2	202.0	19.4	0.0	0.0	589.8
El Saladillo	0.0	6.4	0.0	0.2	0.0	5.0	144.6	130.2	53.4	1.6	0.0	0.0	341.4
Emiliano Zapata	0.0	5.4	0.0	5.2	7.4	77.8	96.4	249.2	117.4	21.2	1.8	0.0	581.8
Estancia de Ánimas	0.0	5.8	0.0	4.2	10.2	32.8	174.6	283.2	54.0	0.6	0.0	0.0	565.4
La Victoria	0.0	4.2	0.0	0.6	17.2	19.8	75.4	180.6	78.0	0.8	0.0	0.0	376.6
Las Arcinas	0.0	7.2	0.0	2.2	19.8	10.2	184.4	273.6	122.2	0.0	0.0	0.0	619.6
Loreto	0.0	2.2	0.0	11.4	14.0	40.4	225.2	251.0	35.8	0.8	0.0	0.0	580.8
Marianita	0.0	2.0	0.0	0.2	12.0	32.0	43.8	179.2	96.8	3.6	0.0	0.0	369.6
Mesa de Fuentes	0.0	11.4	0.0	18.0	11.2	44.4	148.4	224.8	155.8	2.2	0.0	0.0	616.2
Mogotes	0.0	0.8	0.0	2.0	4.8	56.2	130.4	275.8	207.4	17.8	0.0	0.0	695.2
Momax	0.0	1.6	0.0	7.4	7.6	208.6	268.0	205.0	141.2	10.0	0.4	0.0	849.8
Providencia	0.0	2.0	0.0	2.6	4.2	68.2	103.8	299.0	127.4	29.6	0.0	0.0	636.8
Rancho Grande	0.0	10.0	0.0	0.0	6.0	10.6	96.0	251.6	97.0	0.0	0.0	0.0	471.2
Santa Fe	0.0	11.8	0.0	10.0	5.4	94.4	227.4	215.8	102.6	15.8	0.0	0.0	683.2
Santa Rita	0.0	8.0	0.0	5.4	3.4	48.6	159.4	265.8	50.4	0.8	0.0	0.0	541.8
Santo Domingo	0.0	2.0	0.0	0.8	6.4	143.8	203.2	146.6	0.0	15.2	0.0	0.0	518.0
Sierra Vieja	0.0	8.8	0.0	2.6	7.0	7.8	46.8	113.0	93.8	2.6	0.0	0.0	282.4
Tanque Hacheros	0.0	2.0	0.0	12.4	14.4	5.6	55.2	229.2	53.0	22.2	0.0	0.2	394.2
Tierra Blanca	0.0	2.0	0.0	2.0	2.8	83.0	218.6	279.8	84.4	24.8	0.0	0.0	697.4
U.A. Agronomía	0.0	8.8	0.0	6.6	14.8	55.0	131.0	313.8	99.6	5.6	0.0	0.0	635.2
U.A. Biología	0.0	8.2	0.0	13.6	19.4	26.2	135.8	163.2	97.0	0.6	0.0	0.0	464.0
Villanueva	0.0	4.2	0.0	5.2	6.2	52.8	184.8	380.8	198.2	16.2	0.0	0.0	848.4
PROMEDIO	0.0	5.6	0.0	4.6	9.2	55.7	134.9	219.1	113.7	10.4	0.1	0.0	553.3
VALOR MÁXIMO	0.0	14.0	0.0	18.0	22.0	208.6	309.4	380.8	207.4	29.6	1.8	0.2	849.8
VALOR MÍNIMO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	43.8	113.0	0.0	0.0	0.0	0.0	282.4

Literatura citada

- Critchfield. 1983. General Climatology. 4^a Ed. Prentice Hall Inc. New Jersey, USA. 453 p.
- FAO. 1981. Informe del proyecto de zonas agroecológicas. Vol. 3: Metodología y resultados para América del Sur y Central. FAO 48/3. Roma. 143 p.
- Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI). 2006. Anuario estadístico edición 2006. Zacatecas.
- Medina G., G.; A. Rumayor R.; B. Cabañas C.; M. Luna F.; J. A. Ruiz C.; C. Gallegos V.; J. Madero T.; R. Gutiérrez S.; S. Rubio D. y A. G. Bravo L. 2003. Potencial productivo de especies agrícolas en el estado de Zacatecas. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Centro de Investigación Regional Norte Centro, Campo Experimental Zacatecas, Calera de V.R., Zacatecas., México. 157 p. (Libro Técnico No. 2).
- Medina G., G. y Torres G., A. 2005. Red de Monitoreo Agroclimático del estado de Zacatecas. Desplegable informativa Núm. 15. Centro de Investigación Regional Norte-Centro. Campo Experimental Zacatecas. Calera, Zacatecas, México.
- Ortiz S., C. A. 1987. Elementos de agrometeorología cuantitativa. Tercera edición. Departamento de Suelos. Universidad Autónoma Chapingo. Chapingo, México. 326 p.
- Romo G., J. R. y Arteaga R., R. 1989. Meteorología agrícola. Segunda edición. Universidad Autónoma Chapingo. Departamento de Irrigación. Chapingo, México. 442 p.
- Silva S., M. M. y Hess M., L. 2001. Caracterización del clima en el norte de Tamaulipas y su relación con la agricultura. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Centro de Investigación Regional del Noreste. Campo Experimental Río Bravo, Río Bravo Tamaulipas, México. 50 p. (Publicación técnica No. 1).
- Torres R., E. 1983. Agrometeorología. Editorial Diana, México D. F. 150 p.
- Villalpando I., J. F. 1985. Metodología de investigación en agroclimatología. Documento de circulación interna mimeografiado. INIA-SARH. Zapopan, Jalisco. 183 p.
- Villalpando I., J. F. y Ruiz C., J. A. 1993. Observaciones agrometeorológicas y su uso en la agricultura. Editorial Limusa, S. A. de C. V. México, D. F. 133 p.

Comité Editorial del Campo Experimental Zacatecas

Presidente: MC. Agustín F. Rumayor Rodríguez

Secretario: Dr. Mario D. Amador Ramírez

Vocal: Dr. Alfonso Serna Pérez

Revisión y edición

Dr. Mario D. Amador Ramírez

Dr. Ramón Gutiérrez Luna

CAMPO EXPERIMENTAL ZACATECAS
Kilómetro 24.5 Carretera Zacatecas-Fresnillo
Apartado postal No. 18
Calera de V.R., Zac., 98500

Tel: (478) 9-85-01-98 y 9-85-01-99

Fax: (478) 9-85-03-63

Correo electrónico: direccion@zacatecas.inifap.gob.mx

Página WEB: <http://www.zacatecas.inifap.gob.mx>

Toda la información presentada en esta publicación proviene del proyecto:
RED DE MONITOREO AGROCLIMÁTICO DEL ESTADO DE ZACATECAS
Financiado por la FUNDACIÓN PRODUCE ZACATECAS, A.C.

Esta publicación se terminó en diciembre del 2008.
Tiraje: Publicación electrónica distribuida en formato PDF



FUNDACIÓN *Zacatecas* A.C.
PRODUCE
inifap

The central logo features the text "FUNDACIÓN" and "PRODUCE" in blue, with "Zacatecas" in a green script font and "A.C." in blue. Below this, the word "inifap" is written in a large, bold, green font, with a small orange and yellow graphic element integrated into the letter 'i'.